ANLEITUNG — PILZ-GROWKIT

Dein Copelandia Hawaiian Growkit

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vom Öffnen der Box bis zu deinem zweiten Flush. Psilocybe cyanescens „Copelandia Hawaiian“.

IN DER BOX

1 Growkit · 1 Growbeutel · 1 Becher mit Deckschicht (Casing)



21–26 °C
ideale Temperatur

95–100%
Luftfeuchtigkeit

6–11 Tage
bis zum Pinning

SCHRITT 1 — BEVOR DU BEGINNST

Was ist in der Box

Öffne die Box und nimm den Inhalt heraus. Die Box enthält:

1 GROWKIT

Das Substrat, aus dem deine Pilze wachsen.

2 GROWBEUTEL

Hier steht dein Kit drin und die Feuchtigkeit bleibt.

3 DECKSCHICHT

Das Casing, das du auf dem Substrat verteilst.

DU BRAUCHST AUSSERDEM

Wasser und Seife
Zum gründlichen Händewaschen.

Latexhandschuhe
Sauber, zum Verteilen der Deckschicht.

Desinfektionsgel
Am besten auf Alkoholbasis.

Mundschutz
Optional, für extra Hygiene.

Sprühflasche
Zum Besprühen von Deckschicht und Beutel.

Büroklammer
Zum Verschließen des Growbeutels.

HYGIENE IST ALLES

Wasche dir gründlich die Hände mit Wasser und Seife, bevor du das Growkit berührst. Saubere Hände und Handschuhe verhindern Kontamination.

SO LÄUFT DEIN GROW AB

1. **Box öffnen**
2. **Deckschicht auftragen**
3. **Besprühen und schließen**
4. **Tägliche Pflege** · 1–2× täglich
5. **Die ersten Pins** · nach 6–11 Tagen
6. **Ernten** · 5–7 Tage danach
7. **Zweiter Flush**

2 DECKSCHICHT AUFTRAGEN

Arbeite so sauber wie möglich — das verhindert Kontamination.

- Wasche dir gründlich die Hände mit Wasser und Seife. Wir empfehlen **Latexhandschuhe** und (alkoholisches) **Desinfektionsgel**. Trage eventuell einen Mundschutz.
- Verteile die Deckschicht **gleichmäßig** auf dem Substrat. Das geht am besten mit den Händen, während du saubere Latexhandschuhe trägst.
- Stelle das Growkit danach in den mitgelieferten **Growbeutel**.

3 BESPRÜHEN UND SCHLIESSEN

Die Deckschicht muss gut feucht sein, bevor du den Beutel schließt.

- Während das Kit im Beutel steht, besprühst du die Deckschicht gründlich, bis sie gut feucht ist — **aber nicht durchnässt!**
- Besprühe auch die **Innenseite des Beutels**.
- Sorge für genug frische Luft im Beutel und verschließe ihn mit einer **Büroklammer**.

Feucht, nicht durchnässt
DIE DECKSCHICHT MUSS GUT FEUCHT SEIN

4 TÄGLICHE PFLEGE

Halte Deckschicht und Growbeutel in dieser Phase stets feucht.

- Besprühe **1 bis 2 Mal täglich** die Deckschicht und die Innenseite des Beutels.
- Drücke den Beutel vorsichtig zusammen, um alte Luft hinaus- und frischen Sauerstoff hereinzulassen.
- In dieser Phase ist es sehr wichtig, dass Deckschicht und Beutel **feucht bleiben**.

Nach 6–11 Tagen
ERSCHEINEN DIE ERSTEN PINS

5 DIE ERSTEN PINS

Sobald sich die Pilze bilden, ändert sich die Pflege.

SOBALD DIE PINS ERSCHEINEN

- Nimm das Kit aus dem Beutel, besprühe die **Innenseite des Beutels** und tausche die Luft aus.
- Stelle das Kit danach wieder in den Beutel.

ERSTER FLUSH WÄCHST LANGSAM?

- Wachsen die Pilze langsam oder bleiben klein? Nimm das Kit aus dem Beutel und gieße **1–2 cm Wasser** in den Beutel. Nach ein, zwei Tagen kommt das Wachstum wieder in Gang.

CYANESCENS UND WASSER

Cyanescens reagieren schlecht auf direkten Kontakt mit Wasser. Deshalb nimmst du das Kit aus dem Beutel, bevor du die Innenseite besprühst.

6 ZEIT ZUM ERNTEN

Cyanescens dürfen länger reifen als Cubensis.

- Die Pilze sind **5 bis 7 Tage** nach dem Pinning erntereif.
- Ernte sie **24–36 Stunden**, nachdem die schwarzen Sporen zu fallen beginnen. Anders als Cubensis lässt man Cyanescens besser etwas länger reifen.
- Pflücke die Pilze, indem du sie vorsichtig umdrückst, bis der Stiel unten abbricht.

5–7 Tage nach dem Pinning
ERNTE 24–36 STD. NACH DEN ERSTEN SPOREN

7 ZWEITER FLUSH

Nach der Ernte kann das Kit erneut Pilze bilden.

- Befeuchte die Deckschicht wieder gut, indem du aus etwa **10 cm Abstand** gründlich sprühst.
- Es ist nicht schlimm, wenn ein, zwei Zentimeter Wasser unten im Beutel stehen bleiben.
- Jetzt beginnt der zweite Flush. Halte den Beutel feucht.

NIE DIE NEUEN PILZE BESPRÜHEN

Halte den Beutel feucht, aber besprühe niemals die neuen Pilze.

REFERENZ

Copelandia Grow-Parameter

Halte dich an diese Werte für die besten Ergebnisse.

PHASE 1

Bildung der Primordien

Starttemperatur
21–26 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
95–100%

PHASE 2

Entwicklung der Fruchtkörper

Temperatur
21–26 °C

Relative Luftfeuchtigkeit
90–95%

STÄRKE VON COPELANDIA MAGIC MUSHROOMS

±5× stärker als Cubensis

Cyanescens-Pilze sind etwa fünfmal stärker als Cubensis. Berücksichtige das bei der Wahl der richtigen Dosierung.

IMMER NIEDRIG ANFANGEN

Beginne immer mit einer niedrigen Dosis und konsumiere verantwortungsvoll.

KUNDENSERVICE

Fragen zu deinem Growkit? Unser Team hilft dir gern.

support@24high.nl

copelandia
HAWAIIAN · P. CYANESCENS