copelandia

HAWAIIAN · P. CYANESCENS

ISTRUZIONI — KIT DI COLTIVAZIONE FUNGHI

Il tuo kit di coltivazione Copelandia Hawaiian

Una guida passo dopo passo, dall'apertura della scatola al secondo flush. Psilocybe cyanescens «Copelandia Hawaiian».

NELLA SCATOLA

1 kit di coltivazione · 1 sacchetto di coltivazione · 1 bicchierino di strato di copertura



21–26 °C
temperatura ideale

95–100%
umidità

6–11 giorni
fino ai primordi

PASSAGGIO 1 — PRIMA DI INIZIARE

Cosa c’è nella scatola

Apri la scatola ed estrai il contenuto. La scatola contiene:

1 KIT

Il substrato da cui crescono i tuoi funghi.

2 SACCHETTO

Contiene il kit e trattiene l’umidità.

3 COPERTURA

Lo strato da stendere sul substrato.

TI SERVE ANCHE

Acqua e sapone
Per lavarti bene le mani.

Guanti in lattice
Puliti, per stendere la copertura.

Gel igienizzante
Preferibilmente a base alcolica.

Mascherina
Facoltativa, per più igiene.

Spruzzino
Per nebulizzare copertura e sacchetto.

Graffetta
Per chiudere il sacchetto.

L’IGIENE È TUTTO

Lavati bene le mani con acqua e sapone prima di toccare il kit. Mani e guanti puliti evitano la contaminazione.

COME PROCEDE LA TUA COLTIVAZIONE

1. **Aprire la scatola**
2. **Stendere la copertura**
3. **Nebulizzare e chiudere**
4. **Cura quotidiana** · 1–2× al giorno
5. **I primordi** · dopo 6–11 giorni
6. **Raccolto** · 5–7 giorni dopo
7. **Secondo flush**

2 STENDERE LA COPERTURA

Lavora nel modo più pulito possibile — così eviti la contaminazione.



- Lavati bene le mani con acqua e sapone. Consigliamo **guanti in lattice** e **gel igienizzante** (a base alcolica). Se vuoi, indossa una mascherina.
- Stendi lo strato di copertura **in modo uniforme** sul substrato. È meglio farlo con le mani, indossando guanti in lattice puliti.
- Poi metti il kit nel **sacchetto di coltivazione** incluso.

3 NEBULIZZARE E CHIUDERE

La copertura deve essere ben umida prima di chiudere il sacchetto.



- Con il kit nel sacchetto, nebulizza bene la copertura finché è ben umida — **ma non zuppa!**
- Nebulizza anche l'**interno del sacchetto**.
- Assicurati che nel sacchetto ci sia abbastanza aria fresca e chiudilo con una **graffetta**.

Umida, non zuppa
LA COPERTURA DEVE ESSERE BEN BAGNATA

4 CURA QUOTIDIANA

Mantieni umidi copertura e sacchetto per tutta questa fase.

- Nebulizza la copertura e l'interno del sacchetto **1 o 2 volte al giorno**.
- Schiaccia delicatamente il sacchetto per far uscire l'aria vecchia ed entrare ossigeno fresco.
- In questa fase è molto importante che copertura e sacchetto **restino umidi**.

Dopo 6–11 giorni
COMPAIONO I PRIMORDI

5 I PRIMORDI

Quando i funghi iniziano a formarsi, la cura cambia.

QUANDO COMPAIONO I PRIMORDI

- Togli il kit dal sacchetto, nebulizza l'**interno del sacchetto** e rinnova l'aria.
- Poi rimetti il kit nel sacchetto.

IL PRIMO FLUSH CRESCE LENTAMENTE?

- I funghi crescono lentamente o restano piccoli? Togli il kit dal sacchetto e versa **1–2 cm d'acqua** nel sacchetto. Dopo un giorno o due la crescita riparte.

CYANESCENS E ACQUA

I cyanescens reagiscono male al contatto diretto con l'acqua. Per questo togli il kit dal sacchetto prima di nebulizzarne l'interno.

6 È ORA DI RACCOGLIERE

I cyanescens possono maturare più a lungo dei cubensis.

- I funghi sono pronti da raccogliere **5–7 giorni** dopo la comparsa dei primordi.
- Raccoglili **24–36 ore** dopo che le spore nere iniziano a cadere. A differenza dei cubensis, è meglio lasciar maturare i cyanescens un po' più a lungo.
- Raccogli i funghi spingendoli delicatamente finché il gambo si spezza alla base.

5–7 giorni dopo i primordi
RACCOGLI 24–36 ORE DOPO LE PRIME SPORE

7 SECONDO FLUSH

Dopo il raccolto, il kit può produrre di nuovo funghi.

- Inumidisci di nuovo bene la copertura nebulizzando a fondo da circa **10 cm di distanza**.
- Non è un problema se sul fondo del sacchetto restano uno o due centimetri d'acqua.
- Ora inizia il secondo flush. Mantieni il sacchetto umido.

NON NEBULIZZARE MAI I NUOVI FUNGHI

Mantieni il sacchetto umido, ma evita sempre di nebulizzare i nuovi funghi.

RIFERIMENTO

Parametri di coltivazione Copelandia

Rispetta questi valori per ottenere i migliori risultati.

FASE 1

Formazione dei primordi

Temperatura iniziale
21–26 °C

Umidità relativa
95–100%

FASE 2

Sviluppo dei corpi fruttiferi

Temperatura
21–26 °C

Umidità relativa
90–95%

POTENZA DEI FUNGHI MAGICI COPELANDIA

±5× più potenti dei cubensis

I funghi cyanescens sono circa cinque volte più potenti dei cubensis. Tienine conto quando scegli la dose giusta.

INIZIA SEMPRE BASSO

Inizia sempre con una dose bassa e consuma in modo responsabile.

SERVIZIO CLIENTI

Domande sul tuo kit di coltivazione? Il nostro team ti aiuta volentieri.

support@24high.nl

copelandia
HAWAIIAN · P. CYANESCENS