

# P. cyanescens “Copelandia Hawaiian” KIT DI COLTIVAZIONE DI FUNGHI

## Istruzioni:

1. Apri la scatola e rimuovi il contenuto. La scatola contiene:

- 1 kit di coltivazione
- 1 sacchetto di coltivazione
- 1 bicchierino con strato superiore (strato di casing)

2. Lava bene le mani con acqua e sapone. Ti consigliamo di usare guanti in lattice e un gel disinfettante (a base alcolica). Se ne hai uno, indossa anche una mascherina. Distribuisci lo strato superiore uniformemente sul substrato. È meglio farlo con le mani indossando guanti in lattice puliti. Poi, inserisci il kit nel sacchetto di coltivazione fornito.

3. Mentre il kit è nel sacchetto, nebulizza abbondantemente lo strato superiore in modo che sia ben umido (ma non inzuppato!). Nebulizza anche l'interno del sacchetto. Assicurati che ci sia abbastanza aria fresca e chiudi il sacchetto con una graffetta.

4. Continua a nebulizzare quotidianamente (1–2 volte al giorno) lo strato superiore e l'interno del sacchetto. Premi delicatamente il sacchetto per far uscire l'aria vecchia e far entrare ossigeno fresco. È molto importante mantenere umidi sia lo strato superiore che l'interno del sacchetto in questa fase.

5. Dopo 6–11 giorni inizieranno a formarsi i funghi (pins). A questo punto, estrai il kit dal sacchetto, nebulizza l'interno e rinnova l'aria. I funghi Cyanescens non tollerano bene il contatto diretto con l'acqua. Dopo aver fatto ciò, rimetti il kit nel sacchetto.

A volte i funghi nella prima ondata crescono lentamente o sono più piccoli. Se accade, rimuovi il kit e versa 1–2 cm d'acqua nel fondo del sacchetto. Dopo uno o due giorni, la crescita dovrebbe riprendere.

6. I funghi saranno pronti per la raccolta 5–7 giorni dopo l'inizio della formazione dei pins. Raccoglili 24–36 ore dopo la caduta delle spore nere. A differenza dei Cubensis, è meglio lasciare maturare un po' di più i Cyanescens. Raccoglili piegandoli delicatamente fino a quando il gambo si spezza alla base.

7. Dopo la raccolta, inumidisci nuovamente lo strato superiore nebulizzandolo abbondantemente da una distanza di circa 10 cm. Non è un problema se si accumulano 1–2 cm d'acqua sul fondo del sacchetto. Ora inizierà la seconda ondata di crescita. Mantieni il sacchetto umido, ma evita sempre di spruzzare direttamente sui nuovi funghi.

## PARAMETRI DI COLTIVAZIONE DEL COPELANDIA:

### **FASE 1: FORMAZIONE DEI PRIMORDIA**

Temperatura di avvio: 21–26°C

Umidità relativa: 95–100%

### **FASE 2: SVILUPPO DEI CORPI FRUTTIFERI**

Temperatura: 21–26°C

Umidità relativa: 90–95%

### **POTENZA DEI FUNGHI MAGICHI COPELANDIA**

I funghi *Cyanescens* sono circa cinque volte più potenti dei *Cubensis*. Tienilo a mente quando decidi il dosaggio. Inizia sempre con una dose bassa e consuma in modo responsabile.