

# **P. cyanescens “Copelandia Hawaiian” KIT DE CULTIVO DE HONGOS**

## **Instrucciones:**

1. Abre la caja y saca el contenido. La caja contiene:

- 1 kit de cultivo
- 1 bolsa de cultivo
- 1 vaso con capa superior (capa de casing)

2. Lávate bien las manos con agua y jabón. Recomendamos el uso de guantes de látex y gel desinfectante (con alcohol). Si tienes una mascarilla, también puedes usarla. Extiende la capa superior uniformemente sobre el sustrato. Lo mejor es hacerlo con las manos mientras usas guantes de látex limpios. Luego, coloca el kit dentro de la bolsa de cultivo suministrada.

3. Mientras el kit esté dentro de la bolsa, rocía bien la capa superior para que quede húmeda (¡pero no empapada!). Rocía también el interior de la bolsa. Asegúrate de que haya suficiente aire fresco dentro y cierra la bolsa con un clip.

4. Rocía la capa superior y el interior de la bolsa una o dos veces al día. Aprieta suavemente la bolsa para sacar el aire viejo y permitir que entre oxígeno fresco. Es muy importante mantener húmedas tanto la capa superior como la bolsa durante esta fase.

5. Después de 6 a 11 días, comenzarán a aparecer los hongos (pins). En ese momento, saca el kit de la bolsa, rocía el interior y renueva el aire. Los *Cyanescens* no reaccionan bien al contacto directo con el agua. Una vez hecho esto, vuelve a colocar el kit en la bolsa.

A veces, los hongos crecen más lentamente o son más pequeños en la primera cosecha. Si esto ocurre, retira el kit y añade 1–2 cm de agua en el fondo de la bolsa. Después de uno o dos días, los hongos deberían volver a crecer.

6. Los hongos estarán listos para cosechar entre 5 y 7 días después de que empiecen a pinnear. Cosecha entre 24–36 horas después de que empiecen a caer las esporas negras. A diferencia de los *Cubensis*, es mejor dejar que los *Cyanescens* maduren un poco más. Recógelos inclinándolos suavemente hasta que el tallo se rompa en la base.

7. Después de la cosecha, vuelve a humedecer bien la capa superior rociándola desde una distancia de unos 10 cm. No pasa nada si se acumulan 1–2 cm de agua en el fondo de la bolsa. Entonces comenzará la segunda cosecha. Mantén la bolsa húmeda, pero evita rociar directamente los nuevos hongos.

## **PARÁMETROS DE CULTIVO DE COPELANDIA:**

### **FASE 1: FORMACIÓN DE PRIMORDIA**

Temperatura de inicio: 21–26°C

Humedad relativa: 95–100%

### **FASE 2: DESARROLLO DEL CUERPO FRUCTÍFERO**

Temperatura: 21–26°C

Humedad relativa: 90–95%

### **POTENCIA DE LOS HONGOS MAGICOS COPELANDIA**

Los hongos Cyanescens son aproximadamente cinco veces más potentes que los Cubensis. Ten esto en cuenta al calcular la dosis correcta. Empieza siempre con una dosis baja y consume con responsabilidad.