

P. cyanescens “Copelandia Hawaiian” KIT DE CULTURE DE CHAMPIGNONS

Instructions :

1. Ouvrez la boîte et retirez son contenu. La boîte contient :

- 1 kit de culture
- 1 sac de culture
- 1 gobelet de couche de couverture (couche de casing)

2. Lavez-vous soigneusement les mains avec de l'eau et du savon. Nous recommandons d'utiliser des gants en latex et un gel désinfectant (à base d'alcool). Portez éventuellement un masque facial. Répartissez uniformément la couche de couverture sur le substrat. Il est préférable de le faire avec les mains en portant des gants en latex propres. Ensuite, placez le kit de culture dans le sac de culture fourni.

3. Pendant que le kit de culture se trouve dans le sac, vaporisez soigneusement la couche de couverture pour qu'elle soit bien humide (mais pas détrempée !). Vaporisez également l'intérieur du sac. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'air frais dans le sac et fermez-le avec un trombone.

4. Continuez à vaporiser quotidiennement (1 à 2 fois par jour) la couche de couverture et l'intérieur du sac de culture. Pressez doucement le sac pour en évacuer l'air vicié et faire entrer de l'oxygène frais. Il est très important à ce stade de maintenir l'humidité de la couche de couverture et du sac.

5. Après 6 à 11 jours, les champignons commenceront à se former (pins). À ce moment-là, retirez le kit du sac, vaporisez l'intérieur du sac et renouvelez l'air. Les Cyanescens ne réagissent pas bien au contact direct avec l'eau. Replacez ensuite le kit dans le sac.

Il peut arriver que les champignons poussent plus lentement ou soient plus petits lors de la première récolte. Si cela se produit, retirez le kit du sac et ajoutez 1 à 2 cm d'eau dans le fond du sac. Après un ou deux jours, la croissance devrait reprendre normalement.

6. Les champignons seront prêts à être récoltés 5 à 7 jours après le début de la formation des pins. Récoltez-les 24 à 36 heures après que les spores noires commencent à tomber. Contrairement aux Cubensis, il est préférable de laisser mûrir un peu plus longtemps les champignons Cyanescens. Récoltez-les en les penchant doucement jusqu'à ce que la base de la tige casse.

7. Après la récolte, veillez à bien réhydrater la couche de couverture en la vaporisant abondamment à environ 10 cm de distance. Il n'est pas grave s'il reste 1 à 2 cm d'eau au fond du sac. La deuxième vague de pousse commencera alors. Gardez le sac humide, mais évitez toujours de vaporiser directement sur les nouveaux champignons.

PARAMÈTRES DE CULTURE DU COPELANDIA :

ÉTAPE 1 : FORMATION DES PRIMORDIA

Température de déclenchement : 21–26°C

Humidité relative : 95–100%

ÉTAPE 2 : DÉVELOPPEMENT DES CORPS FRUCTIFÈRES

Température : 21–26°C

Humidité relative : 90–95%

PUISSANCE DES CHAMPIGNONS MAGIQUES COPELANDIA

Les champignons Cyanescens sont environ cinq fois plus puissants que les Cubensis. Tenez-en compte pour déterminer le bon dosage. Commencez toujours par une faible dose et consommez de manière responsable.